

## نکات مراقبتی نوزاد سالم

- کودک را برهنه کرده و در موله کلاهدار بسیبد ( از هوله کلاهدار برای کرم تکه‌های قسمت هایی از بدن نوزاد که در مراحل اولیه شسته نمی شود استفاده نمایید .
  - شستشو به ترتیب از سر و صورت شروع شیس (ست ها و پاها و سپس شکم و پشت نوزاد می باشد .
  - تمام چیز های بدن نوزاد مانند زیر بغل ، زیر کردن ، لاله کوش ، و دستکاه تناسلی را با پارچه مطروب پاک و آبکش نمایید .
  - پس از ممام دادن نوزاد داخل موله کلاهدار دیگری بسیبد و کاملا نوزاد را فشک نمایید .
  - نکته مهم : زیور آلات و تافن بلند باعث آسیب رسیدن به نوزاد در طن استفاده نمی شود .
- مراقبت از بند ناف :**
- پومن بندناف نوزاد نرم و مطروب است مدل مناسبی برای رشد بالاتری می باشد .
  - قبل از تماس با نوزاد (ستها) را با آب گرم و صابون بشویید . به بند ناف دقت کرده و بوی خیر طبیعی و علوم ظاهری را بررسی نمایید . (قزمی - التهاب - ترشحات، چرکی - نشت فون )
  - بندناف باید فشک و تمیز نگه داشته شود تا زمانی که نیفراخ نوزاد را نباید در آب غوطه ور کرد .
  - بندناف همیشه بیرون از پوشک و مشمع نوزاد باشد تا در بیان هوا قرار بگیرد و زودتر فشک شود .
  - از پانداز یا ناف بند استفاده نشود .
  - از بکار بردن مواد ضد عفونی کننده پرهیز کنید زیرا موادی مانند الکل به علت کشتن بالاتری های مفید پوست اغفارن بندناف را به تاثیر می اندازد .
- زمان طبیعی اختارن بند ناف 5 تا 15 روز پس از تولد می باشد . مراقبت از بند ناف نوزاد نیاز به تعویز هیچ دارویی به منظور پیشگیری از بروز عفونت ندارد و فقط شستشوی (ست ها هنگام تماس با بند ناف توصیه می شود .
  - در صورتیکه نوزاد یکی از علائم زیر را داشته باشد ب پزشک یا مرکز درمان مراجعه نمایید :
    - نوزاد کمتر از 8 بار در 24 ساعت شیر می فورد و بیهال و فواب آلوار است .
    - نوزاد پس از 4 روز کمتر از 6 کله نه فیس در روز دارد .
    - نوزاد پس از 4 روز کمتر از 4 بار دفع مدفوع دارد .
    - نوزاد نرگزی دارد .
    - نوزاد کبود می شود و یا افتلال هوشیاری دارد .
    - در هفته های بعدی آنکه وزن کیبری تاکافی کمتر از 200 کرم در هفته دارد .

- استخدام نوزاد**
- اولین ارزیابی پس از ترفیض نوزاد پیش از پایان 48 ساعت اول عمر انجام شود و نوزاد در معرض خطر کمتر از 24 ساعت پس از ترفیض مجاہنه توسط پزشک انجام شود .
  - اولین تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و آغاز شیردهی در نوزاد سالم بلا خاصیه پس از تولد صورت می کند و شروع زودهنگام شیردهی باعث تراویم شیردهی و احساس امنیت در مادر و نوزاد می شود .
  - هنگام تجویل مشخصات نوزاد شامل دو مج بند است که مشخصات روی آن شامل هنسیبیت نوزاد ، نام و نام فانوادگی مادر ، تاریخ و ساعت (حقیقی تولد نوزاد و شماره پرونده مادر می باشد و تا هنگام ترفیض نوزاد مج بند روی دست راست و پای چپ باز نشود .
  - اولین دفع مدفوع تا 24 ساعت اول می باشد و عدم دفع آن تا 48 ساعت احتمال انسداد دستگاه گوارش تهاتی را می دهد و اولین دفع ادرار در طن 12 ساعت اول و عدم دفع آن طن 24 ساعت احتمال انسداد مجاری ادراری را می دهد .

## مراقبت از بند ناف :

- پومن بندناف نوزاد نرم و مطروب است مدل مناسبی برای رشد بالاتری می باشد .
- قبل از تماس با نوزاد (ستها) را با آب گرم و صابون بشویید . به بند ناف دقت کرده و بوی خیر طبیعی و علوم ظاهری را بررسی نمایید . (قزمی - التهاب - ترشحات، چرکی - نشت فون )
- بندناف باید فشک و تمیز نگه داشته شود تا زمانی که نیفراخ نوزاد را نباید در آب غوطه ور کرد .
- بندناف همیشه بیرون از پوشک و مشمع نوزاد باشد تا در بیان هوا قرار بگیرد و زودتر فشک شود .
- از پانداز یا ناف بند استفاده نشود .
- از بکار بردن مواد ضد عفونی کننده پرهیز کنید زیرا موادی مانند الکل به علت کشتن بالاتری های مفید پوست اغفارن بندناف را به تاثیر می اندازد .

## استخدام نوزاد

- اولین ارزیابی پس از ترفیض نوزاد اول عمر برای نوزادان سالم

نوزاد سالم : نوزادی است که علائم میانی ، فعالیت ، ظاهر ، رنگ و تقدیمه طبیعی داشته باشد . نوزاد به ظاهر سالم هنچ با وزن زمان تولد 1800-2500 کرم که علامت بالین غیر طبیعی ندارد در بخش همراه و در کنار مادر تکه‌های می شود .

نکته مهم که باید در نظر گرفته شود شستشوی (ست ها می باشد که مهمترین راه پیشگیری از انتقال عفونت است .

کرمای توصیه شده برای اتاق نوزاد 25-28 درجه سانتیگراد می باشد .

اولین تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و آغاز شیردهی در نوزاد سالم بلا خاصیه پس از تولد صورت می کند و شروع زودهنگام شیردهی باعث تراویم شیردهی و احساس امنیت در مادر و نوزاد می شود .

هنگام تجویل مشخصات نوزاد شامل دو مج بند است که مشخصات روی آن شامل هنسیبیت نوزاد ، نام و نام فانوادگی مادر ، تاریخ و ساعت (حقیقی تولد نوزاد و شماره پرونده مادر می باشد و تا هنگام ترفیض نوزاد مج بند روی دست راست و پای چپ باز نشود .

اولین دفع مدفوع تا 24 ساعت اول می باشد و عدم دفع آن تا 48 ساعت احتمال انسداد دستگاه گوارش تهاتی را می دهد و اولین دفع ادرار در طن 12 ساعت اول و عدم دفع آن طن 24 ساعت احتمال انسداد مجاری ادراری را می دهد .

- پوشک نوزاد تا حد امکان باز باشد و در صورت بستن سفت بسته نشود.
  - علائم خطر پس از انباشم قته :
    - فونریزی یا تغییر رنگ و تیره شدن نوک آلت و فون مردگی وسیع آلت و بینه
    - تورم شدید آلت و بینه
    - ادرار کثیر نوزاد تا 24 ساعت پس از قته
    - اختارن ملقه در کمتر از 2 روز یا نیافرادرن ملقه تا 10 روز پس از قته
    - عفونت معل قته
    - تب نوزاد  - پوشاندن لباس :
    - جنس لباس نوزاد باید از پنهان یا نخ باشد.
    - برای نوزاد پوشش مناسب فحمل استفاده شود و موقعیت آب و هوایی در نظر گرفته شود.
    - برای فروج از مفیط اتفاق در سرما استفاده از پتو و یا اضافه کرده به لباس تازک ضروری است.
    - از لباس های دکمه دار استفاده کنید. (لباس زیپ دار توصیه نمی شود).  - تدوین : زهره حاتم زاده/کارشناس مامایی
  - منبع : توضیح المسائل
  - بلوک زایمان بیمارستان امام حسن عسکری (ع)
  - بهار 1402
  - شماره ثبت : PAM-CHB
- نوزاد با کوکلان دیگر در رفقواب مشترک نفواید.
  - از مصرف داناییات و مواد مضر و مواد سمی (مشهه کش ها) در مهل فواب نوزاد اجتناب شود.
  - آن مادر فسته است و یا بیمار است نوزاد را در رفقواب خود نفواید.
  - برای اینمن بیشتر برای نوزادان که از شیر مادر تغذیه می شوند هنگام خواب رفتن مادر در رفقواب مادر فوابانیده نشود.
  - بهتر آرامش نوزاد در مین خواب پس از هفته اول تا سه ماهگی می توان نوزاد را در مین خواب پتو پیچ نمود.
- اهمیت مراجعات بعدی جهت معاینه :
- آن نوزاد کمتر از 24 ساعت پس از تولد (زایمان طبیعی) بیمارستان را ترک کند، 24 ساعت پس از ترفيض نوبت اویین معاینه او می باشد.
  - آن نوزاد پس از 24 ساعت پس از تولد ترفيض شد را 3-5 روزگی برای معاینه به پوشک مراجعه نماید.
  - کلیه نوزادان در سن 14 تا 28 روزگی باید دوباره مورد معاینه قرار بگیرند.
- قته نوزاد :
- بعترین زمان در ده روز اول تولد می باشد. (ترجیحاً 48 ساعت اول تولد)
  - حداقل 2 ساعت پس از قته تمث نظر پوشک باشد.
  - در پنجم روز اول دور مهل قته از آلوکی مدفوع دور نگاه داشته شود و در صورت آلوکی با آب و صابون شسته شود.
  - روزی 3 بار یا بیشتر از پماد تراستیکلین و یا واژین طبی استفاده شود.
  - حداقل 7 روز پس از قته توسط پوشک معاینه شود.
  - در صورت بی قراری از قطبه استامینوفن استفاده شود. (بر اساس دستور پوشک)
- بین 5 تا 10 روز پس از تولد بندناه سیاه م فشک شده و می افتد در صورتیکه پس از پهار هفته بندناه نیقتل لازم است مراجعت شود.
  - ابازه رهید که بندناه فودش بینند و هنگام زیدا در این صورت ممکن است فونریزی فعال رخ دهد، در صورت فونریزی فعال فوری به پوشک مراجعت شود.
- شستشوی لباس :
- برای شستشوی لباس نوزاد به هر در نوزادان دارای آلرژی و مساسیت پوشتنی نیاز به استفاده از شوینده های مخصوص نیست.
  - لازم است پوشک پارچه ای از سایر لباس ها جدا شسته شود. پوشک های پارچه ای را باید با شوینده ها ملايمشست تا موهب مساسیت و تارهای درستگاه تاسلی و ران ها نشود.
  - از نرم کننده لباس استفاده نشود.
  - برای آبکشی از آب راغ استفاده شود.
  - پاک کننده های مایع بقیرین مواد برای تمیز کردن انواع لباس ها هستند.
  - آن مساسیت پوست ایجاد را باید با شوینده بروان رنگ و عطر استفاده کرد و در صورت تعویض شوینده ابتدا یک قطعه از لباس را اشسته و آن تحریک پوشتن ایجاد نشد برای بقیه لباس ها استفاده شود.
  - در حد امکان لباس های نوزاد را در معرض نور آفتاب فشک نمایید.
- آموزش مادران در زمان خوابانیدن نوزاد :
- بالش مادر طوری باشد که از نوزاد دور باشد.
  - ممیط طوری مغیا شود که خطر سقوط تمادغ یا پوشیده شدن سر و صورت نوزاد با پتو یا ملحفه و جور نداشته باشد.